


陕西省医学重点学科

西安市医学重点学科 · 眼科

# 葡萄膜炎

4



世界眼科组织  
西安眼科中心



西安市第四医院  
XI AN No.4 HOSPITAL

## 什么是斜视？

斜视是指双眼视轴不平行，一只眼在正前方，而另一只眼却向内、向外、向上或向下偏斜。

## 什么是弱视？常见原因有哪些？

弱视是指眼部无明显器质性病变，以功能性因素为主，所引起的远视力矫正视力低于0.9者。

常见原因有：①屈光不正 ②屈光参差  
③斜视 ④形觉剥夺

## 弱视临床分度

轻度弱视：矫正视力为0.8~0.6

中度弱视：矫正视力为0.5~0.2

重度弱视：矫正视力为≤0.1

## 斜视、弱视有哪些危害？

主要表现视力低下，没有完善的双眼视功能及精确的立体视觉，影响外观，对今后的学习、生活及工作带来严重的危害。

## 斜视、弱视能治疗吗？

可以治疗。当您发现孩子患有斜视、弱视后，应尽早到医院找眼科医生检查，因为年龄越小，治疗效果越好，学龄前期

是小儿双眼视觉发育的关键期，也是斜视、弱视治疗的最佳时期。包括配戴眼镜、遮盖疗法、视功能训练及手术治疗等。

## 如何早期发现小儿眼睛有问题？

- ①看电视时，喜欢歪头、眯眼或距离很近。
- ②看远处物体时，一只眼球向外偏斜。
- ③看近处物体时，一只眼球向内偏斜。
- ④在强光下，喜欢闭一只眼睛。

## 怎样预防孩子眼睛毛病？

- ①充足睡眠，合理营养。
- ②避免过早教幼儿识字、看乐谱。
- ③尽量少接触电视、电脑及游戏机。
- ④多做户外运动。
- ⑤每年定期到医院进行视力检查（2~3次）。

## 几种常见的小儿眼病

1. 急性结膜炎：俗称“红眼病”，具有传染性，表现为眼红、眼磨、分泌物多，应及时治疗，防止交叉感染。
2. 先天性上睑下垂：如果上睑遮盖瞳孔

1/2以上，应尽早手术治疗，防止弱视发生。

3. 先天性泪囊炎：出生后单眼或双眼流泪甚至流脓，应及时到医院治疗。

4. 儿童眼外伤：严重者可导致终身视力残疾。重点在于预防，尽量避免小儿玩耍刀、剪、针头、玩具手枪、弹弓、鞭炮等危险物品。

## 几种严重的小儿眼病

1. 先天性白内障：表现晶状体混浊，视力低下。可手术治疗，摘除白内障，植入人工晶体，恢复有用视力。

2. 先天性青光眼：表现眼球增大，角膜发灰，怕光，视力低下。应及时手术治疗。

3. 视网膜母细胞瘤：为婴幼儿严重的眼内恶性肿瘤，对视力和生命有严重的威胁。早期表现瞳孔区“猫眼样反光”。应及时到医院治疗。